

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
<b>F2</b>			
<b>CHOP barn, doksorubicin/syklofosamid/vinkristin - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Prednisolon po dag 1-5, se støtteinformasjon.

Dersom pasienten skal ha rituksimab i tillegg til CHOP, må rituksimab bestilles separat. Bruk felles 090: Rituksimab barn 375 mg/m<sup>2</sup>

**Sykepleierinformasjon :**

Urin-stix (blod) før oppstart. Kontakt lege ved blod +2 eller mer.

**Denne kurdefinisjonen inneholder dosestiger og grupper for følgende doseringslinjer :**

Kurdøgn	Linje nr	Virkestoff	Dosestige / gruppe	Lokal
1	3	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	NaCl til syklofosamid	<input checked="" type="checkbox"/>

**Diagnose**

Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom Barn

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.03.2026 10:50
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.03.2026 10:51
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:08

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
			<b>F2</b>

### CHOP barn, doksorubicin/syklofosamid/vinkristin - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Vinkristin 1,4 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:20) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek

Vinkristin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

Prednisolon er forordnet

2			Mesna 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post
3			Syklofosamid 750 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Urin-stix (blod) er tatt

4			Kaliumklorid 13,28 ml (overflate) ; Natriumklorid 46,48 ml (overflate) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av linje 3)	Glukose 50 mg/ml 664 ml (Overflate)	Post
---	--	--	--	-------------------------------------	------

Glukose 50 mg/ml tilsatt 70 mmol NaCl og 20 mmol KCl pr. 1000 ml. Infusjonshastighet 83 ml/m<sup>2</sup>/time

Hydreringen startes samtidig med syklo og er lagt inn i 8 timer, men kan avsluttes etter 4 timer dersom pasienten drikker bra og ikke har hematuri

5			Doksorubicin 50 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Doksorubicin er vevstoksisk

6			Mesna 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon) (04:00 etter start av linje 3)	-	Post
---	--	--	---	---	------

Denne mesna-dosen kan ev. gis per oralt. Se støtteinfo. for beregning av per oral dose. Må forordnes i MetaVision

7			Mesna 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon) (08:00 etter start av linje 3)	-	Post
---	--	--	---	---	------

Denne mesna-dosen kan ev. gis per oralt. Se støtteinfo. for beregning av per oral dose. Må forordnes i MetaVision

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 25.02.2026 14:53 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.03.2026 10:50 / Tove Ingeborg Krogstad :  
Endret til 20 min inf.tid på vinkristin

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.03.2026 10:50
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.03.2026 10:51
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:08