

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
Euramos1 AP doksorubicin/cisplatin - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Osteosarkom

Protokoll

Euramos 1

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.03.2026 09:55
Kontrollert av : Angel Ernesto Castillo Mandon	Tidspunkt : 10.03.2026 08:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:48

		Kontrollert	ARK NR. 2 av 4	F2
--	--	--------------------	-------------------	-----------

Euramos1 AP doksorubicin/cisplatin - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Kaliumklorid 10 mmol (overflate) ; Magnesiumsulfat 1,5 mmol (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Overflate)	Post

Hydrering, starter 2 timer før cisplatin

Vekt x 2 og døgndiurese, se støtteinfo

Bruk ev. "standardhydrering 2 (sarkom)"

Blodprøver for hele kuren er bestilt

Hydrering tilsatt: 20 mmol KCl og 3 mmol MgSO₄ pr 1000 ml.

2			Kaliumklorid 30 mmol (overflate) ; Magnesiumsulfat 4,5 mmol (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1500 ml (Overflate)	Post
---	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------

Bruk ev. "standardhydrering 2 (sarkom)"

Starter samtidig med cisplatin og doksorubicin

Hydrering tilsatt: 20 mmol KCl og 3 mmol MgSO₄ pr 1000 ml.

3			Cisplatin 60 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (00:00 etter start av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------

Går parallelt med hydreringen i samme løp

Antiemetika er gitt

4			Doksorubicin 37,5 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (00:00 etter start av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------

Doksorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med hydreringen og cisplatin i separat løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.03.2026 09:55
Kontrollert av : Angel Ernesto Castillo Mandon	Tidspunkt : 10.03.2026 08:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
			F2

Euramos1 AP doksorubicin/cisplatin - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Kaliumklorid 30 mmol (overflate) ; Magnesiumsulfat 4,5 mmol (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 2, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1500 ml (Overflate)	Post

Bruk ev. "standardhydrering 2 (sarkom)"

Starter samtidig med cisplatin og doksorubicin

Hydrering tilsatt: 20 mmol KCl og 3 mmol MgSO₄ pr 1000 ml.

2	Cisplatin 60 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 3, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------

Går parallelt med hydreringen i samme løp

3	Doksorubicin 37,5 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 24:00) (24:00 etter start av linje 4, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------

Doksorubicin er vevstoksisk

Går parallelt med hydreringen og cisplatin i separat løp

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.03.2026 09:55
Kontrollert av : Angel Ernesto Castillo Mandon	Tidspunkt : 10.03.2026 08:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:48

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			F2

Euramos1 AP doksorubicin/cisplatin - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Kaliumklorid 20 mmol (overflate) ; Magnesiumsulfat 3 mmol (overflate) (intravenøs infusjon over 08:00) (24:00 etter start av linje 1, kurdag 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Overflate)	Post

Vekt x 2 og døgndiurese, se støtteinfo

Bruk ev. "standardhydrering 2 (sarkom)"

Tilsett 20 mmol KCl og 3 mmol MgSO₄ pr 1000 ml.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.03.2026 09:55 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.03.2026 09:55
Kontrollert av : Angel Ernesto Castillo Mandon	Tidspunkt : 10.03.2026 08:15
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 15.04.2026 14:48